
UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu!

OCUflash®

kapi za oči, rastvor

Proizvođač: UNIMED PHARMA Ltd., Bratislava, Republika Slovačka

Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava Srbije:

UNIMED PHARMA s.r.o., Predstavništvo, Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija

Sastav: natrijum-hlorid 7 mg/1 ml

Pomoćne supstance: benzalkonijum-hlorid (0,004%), dinatrijum-edetat, kalijum-hlorid, magnezijum-hlorid heksahidrat, polisorbit 80, tinktura *Euphrasiae officinalis*, boraks, natrijum-hidroksid, voda za injekcije.

Dejstvo: OCUflash® je izotoničan, puferovan rastvor za oči, koji sadrži ekstrakt biljke *Euphrasia rostkoviana* kao dodatak. Namenjen je za ukapavanje u oči ili za ispiranje oka. Ekstrakt biljke *Euphrasia rostkoviana* deluje kao antiflogistik i adstringent. Ove osobine biljke *Euphrasia rostkoviana* dugo se koriste za smirenje nadraženog (iritiranog) oka, za prevenciju i dodatnu terapiju neinfektivnih upala očnih kapaka i konjunktive oka.

Indikacije: OCUflash® predstavlja idealnu koliriju (losion za oči) za odstranjivanje stranih tela iz oka. Bez konsultacije oftalmologa može da se koristi za jednostavno kratkotrajno ispiranje oka, tako što se ukapa u oko ili se koristi kao obloga za kapke. Proizvod se koristi u slučaju neprijatnih osećaja u oku, kao što su: peckanje, grebanje, svrab i osećaj stranog tela u oku. U praksi OCUflash® je idealno koristiti u sledećim slučajevima:

1. ispiranje oka posle tonometrije i gonioskopije,
2. ispiranje oka radi uklanjanja stranog tela, prašine i hlorisane vode,
3. ispiranje ostatka rastvora fluoresceina,
4. ispiranje mukoznih i supurativnih sekreta,
5. ispiranje oka posle nošenja tvrdih kontaktnih sočiva
6. idealan kao prva pomoć posle blagih erozija konjunktive i oka, izazvanih kiselinama i bazama,
7. kao dopunska terapija neinfektivnih inflamacija i hroničnih infekcija konjunktive.
8. kao pogodan rastvor za uklanjanje kozmetičkih preparata sa predela oka (kapci i trepavice).

OCUflash® mogu da koriste odrasli, deca i mladi. Zbog bezbednosti preparata, može da se koristi i kod novorođenčadi, beba, trudnica i dojilja.

Kontraindikacije: OCUflash[®] se ne sme koristiti kod preosetljivosti na bilo koju komponentu ovog preparata.

Neželjena dejstva: OCUflash[®] se dobro podnosi. Retko, može da se javi prolazan osećaj blagog peckanja, neposredno po primeni.

Upozorenje: OCUflash[®] ne utiče na koncentraciju pri upravljanju motornim vozilom, rukovanju mašinama i radu na visini koji zahteva povećanu pažnju. Međutim nakon primene u konjunktivalnu kesu, može doći do zamagljenosti vida tokom veoma kratkog perioda, tako da aktivnosti koje zahtevaju povećanu pažnju mogu da se obavljaju tek po završetku ovog prolaznog efekta. Kada se proizvod predozira ili ga dete slučajno proguta, terapija je simptomatska.

Istovremeno sa korišćenjem preparata pacijentu nije dozvoljeno nošenje mekih kontaktnih sočiva (naročito hidrofилnih). Ako je moguće tokom primene ne bi trebalo nositi ni tvrda kontaktna sočiva ili ih treba skinuti pre primene preparata a mogu se ponovo stavi najranije 20 minuta nakon ukapavanja.

U slučaju da koristite još neke kapi ili mast za oči, preporučuje se pauza od najmanje 5 minuta.

Interakcije: Nisu prijavljene.

Doziranje: Za smirivanje iritiranih očiju i za dopunsku terapiju neinfektivnih upala konjunktive i kapaka, 1-2 kapi, 1-4 puta dnevno ukapati u konjunktivalnu kesu oka. Za ispiranje stranog tela iz oka, koristiti rastvor dok ne uklonite strano telo iz oka, eventualno i do prestanka smetnji koje je ono izazvalo.

Način primene: Kada se otvori, OCUflash[®] preparat je spreman za spoljašnju upotrebu. Odviti zaštitni poklopac, blago nagnuti glavu unazad, okrenuti bočicu na dole i pritiskanjem plastične flašice ukapati propisani broj kapi u konjunktivalnu kesu. Količina primenjenog rastvora zavisi od načina upotrebe. Po potrebi rastvor se ukapava u oko ili se oko ispira (količina rastvora se kontroliše pritiskom bočice). U slučaju upale kapaka, rastvor može da se koristi i za pravljenje obloga. Prilikom ukapavanja ne treba dodirivati oko, kapke, ni trepavice. Na kraju je potrebno čvrsto zavrnuti poklopac da bi se sprečila eventualna kontaminacija. Bočica se čuva u vertikalnom položaju.

Rok upotrebe: Nakon prvog otvaranja originalnog pakovanja je 28 dana. Posle korišćenja OCUflash[®] preparata, odmah čvrsto zavrnuti poklopac.

Napomena: Preparat ne treba koristiti ako je istekao rok upotrebe.

Pakovanje: 1x10mL, 2x10 mL

Način čuvanja: Čuvati na temperaturi do 25°C. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati. Čuvati van domašaja dece!

Broj Rešenja:

515-02-00435-14-001 od 20.05.2014

CE₂₂₆₅

STERILE	A
---------	---