

POTASSIUM-U

(natrijum-hlorid 2mg/ml)

Kapi za oči, rastvor

1. Šta je POTASSIUM-U i kada se koristi

POTASSIUM-U se koristi za ispiranje očiju. To je izotoničan rastvor u obliku kapi za oči koji sadrži kalijum-jodid. Ukapavanjem kapi Potassium-U rastvora u oko kalijum-jodid dobija važnu ulogu - ponaša se kao snažno sredstvo protiv slobodnih radikala. Ova osobina kalijum-jodida koristi se kao prevencija i kao pomoćni tretman kod eksudacije i krvarenja u oku.

POTASSIUM-U se koristi, uz konsultaciju sa oftalmologom, kao sredstvo za ispiranje oka. Rastvor može da se ukapa u oko ili za pravljenje kompresa za oči. Proizvod se koristi kao pomoć resorptivnim procesima u oku (posebno kod eksudacije, kod krvarenja iz staklastog tela i katarakti svih etiologija).

Preparat mogu da koriste odrasli, mladi i deca.

2. Šta treba da znate pre nego što počnete da koristite POTASSIUM-U

Nemojte da koristite POTASSIUM-U ako ste alergični na bilo koji sastojak ovog preparata (vidite deo 6.)

POTASSIUM-U ne sme da se koristi u sledećim slučajevima:

- preosetljivost na pojedine sastojke proizvoda
- trudnoća i dojenje
- hronična piodermija kože lica
- hemoragične diateze - sklonosti ka krvarenju
- kod pacijenata sa disfunkcijom štitne žlezde
- kod novorođenčadi

U slučaju da koristite još neke kapi ili mast za oči potrebno je da sačekate najmanje 5 minuta posle aplikacije POTASSIUM-U kapi za oči.

3. Upotreba drugih kapi za oči i POTASSIUM-U kapi za oči

Efekti POTASSIUM-U kapi za oči mogu da reaguju sa drugim istovremeno upotrebljenim proizvodom. Ukoliko koristite i druge lekove ili planirate da započnete terapiju lekom čiji je režim propisivanja uz recept ili bez recepta, porazgovarajte sa svojim lekarom. Takođe, ukoliko koristite druge lekove za okularnu primenu konsultujte se sa oftalmologom o podesnosti njihove istovremene upotrebe.

4. Kako da koristite POTASSIUM-U

Doziranje i dužina trajanja terapije je individualno i propisuje ga oftalmolog. Uobičajeno se ukapava u konjunktivalnu kesu 1-2 kapi, 2-4 puta dnevno.

Ako nosite kontaktna sočiva

Ako nosite kontaktna sočiva, skinite ih pre korišćenja POTASSIUM-U za oči. Sačekajte najmanje 20 minuta pre nego što ponovo stavite sočiva.


Uputstvo za upotrebu



1. Operite ruke i udobno sedite ili stanite.
2. Odvrnite poklopac bočice.



3. Držite bočicu prema dole između palca i drugih prstiju.
4. Koristite prst da nežno povučete donji kapak vašeg bolesnog oka



5. Postavite vrh kapaljke blizu oka ali tako da ne dotiče oko ili okolne površine oka.
6. Nežno stisnite bočicu tako da samo jedna kap uđe u oko, zatim spustite donji kapak.



7. Pritisnite prstom ugao bolesnog oka pored nosa. Držite 1 minut sa zatvorenim okom.

8. Ponovite postupak i sa drugim okom ako Vam je lekar rekao da treba to da uradite.
9. Odmah nakon korišćenja leka čvrsto zatvorite poklopac bočice.

5. Koja su moguća neželjena dejstva

POTASSIUM-U se obično dobro podnosi. Odmah po ukapavanju u oko može nastati kratkotrajno lagano peckanje ili bockanje.

Odmah nakon primene leka može doći do zamućena vida, koje može da oteža upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Upravljanje motornim vozilima, rukovanje mašinama ili obavljanje aktivnosti na visini dopušteno je najranije 15 minuta nakon primene preparata.

Posle dugotrajne nekontrolisane upotrebe (prekoračeno propisano doziranje) kod osetljivih pacijenata može da izazove jodizam. To je stanje koje se manifestuje na oku: iritacijom konjunktive, pojačanim suženjem oka, ponekad i pojavom edema očnih kapaka (edem Quinque) i edem suznih žlezda; na koži: pojavom crvenila, akni, dermatitisa i purpura.

Ako se kod Vas pojavi neka od navedenih reakcija, odmah se javite svom lekaru.

Ako primetite bilo koji drugi efekat koji nije naveden u ovom Uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.

6. Šta sadrži POTASSIUM-U

Aktivna supstanca: natrijum-hlorid 2 mg u 1 ml rastvora

Pomoćne supstance: kalijum-jodid; hlorheksidin-diacetat; natrijum-tiosulfat; natrijum-edetat; voda za injekcije.

7. Kako da čuvate POTASSIUM-U i ostale informacije

Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne čuvati u frižideru/ne zamrzavati.

Čuvati POTASSIUM-U van vidokruga i domašaja dece.

Ne sme se koristiti nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju pored simbola peščanog sata. Rok upotrebe je poslednji dan navedenog meseca.

Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja lek se koristi najduže 28 dana. Odmah posle primene POTASSIUM-U kapi zavrnuti čvrsto poklopac.

Pakovanje: 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava, Slovak Republic

Nosilac upisa u Registar medicinskih sredstava Srbije:

UNIMED PHARMA s.r.o., Predstavništvo, Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija

Broj Rešenja:

515-02-01342-16-001 od 18.08.2016



Datum poslednje revizije teksta: Januar 2016.